

薬袋デザイン

内用薬袋デザイン

内 用 薬				様
用		法		
1 日	回	日 分		
1 回	散 剤 錠 剤 カプセル	包 封 個		
食前	食後	食間	おる前	
		時 間 毎		
年 月 日				

100

内 用 薬			
様			
用 法			
1日	回	日分	
食前	食後	食間	
□ 時間	毎・朝・昼・夕	錠・錠・錠	服用
散	剤 は 1 □	□	包 宛 服 用
カプセル	は 1 □	□	個 宛 服 用
錠	剤 は 1 □	□	錠 宛 服 用

○ 用法は包装説明書及び、商品説明書又は交付書に記載の事項を必ず守り、

○ 自用法と包装説明書とが矛盾する場合は、包装説明書に準拠することです。

○ 食後の薬を飲むときは必ず食後2時間以上経過後に服用して下さい。

○ 食後の薬のとり方は必ず食後と時間と両方同時に確認して下さい。

年 月 日

1000000

内 用 薬			
様			
用 法	1 日	回	日分
○毎食（前・後・直後・間）			
明間おき、ねる 前			
1 回 因	散	剤	包
	錠	色	錠 服 用
	剤	色	
	カプセル	色	
		個	個
年 月 日			

100

内 用 薬			様
1 日 回 日分			
1 回に○回の通り服用して下さい			
錠 剤	錠	毎食前	
●	錠	毎食後	
●	錠	毎食前(食後の2時間)	
カプセル	個	朝食前	
●	錠	朝食後	
●	錠	朝・夕・食後	
ご 注 意	告	おる 服用時間)	
●	包	朝・昼・夕・お食前	

年 月 日

100



内用薬

様

用法

1 日 回 日分

食前・食後・食直後・食間・就寝前

分

散

剤

包

1回に

錠

剤

色

色

色

錠

服用

カプセル

色

色

色

個

個

年

月

日

1000000

(内) (用) (薬)

お名前をお読みください。

様

1 日 回 日分

朝・昼・夕・ねる前・_____ 時間毎に
食後・食前・空腹時（食事の前後的２時間）

の
みかた

①開錠 カプセル 〇 粉 は () 嚥下 () 咀嚼 ()
錠 兩 〇 は () 嚥下 () 咀嚼 ()
こな薬 □ は () 嚥下 () 咀嚼 ()

年 月 日

100

内 用 薬	No. _____ _____ 年 月 日		
お名前をお書きください。			
用 法 1 日 回 日 分			
④	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;"> ご年ぐすり 錠 剤 錠 カプセル </td> <td style="width: 30%; padding: 5px;"> 嚥 包 錠 嚥 嚥 嚥 </td> </tr> </table>	ご年ぐすり 錠 剤 錠 カプセル	嚥 包 錠 嚥 嚥 嚥
ご年ぐすり 錠 剤 錠 カプセル	嚥 包 錠 嚥 嚥 嚥		
○④の通りおのみのみ下さい。 朝・昼・夕 ねる 前 食後 30分 食前 30分 食後 2時間 早朝空腹時 食後 すぐ 時間毎 医師の指示どおり ④④の通りおのみのみ下さい。 朝・昼・夕 ねる 前 食後 30分 食前 30分 食後 2時間 早朝空腹時 食後 すぐ 時間毎 医師の指示どおり			
どうぞおだいじに //			

100

年 月 日

様

薬 用 内

用法

1 日 回 日 分

毎食前 後 服用

食べる前 錠 服用

時間毎に 包

どうぞおだいじに//

14 JULY 2005

● 内 用 薬 ●

様

♥ 1 回分

		色 包
		色 錠
		色 錠
		色 包
		色 包

● 1 日 3 回 毎食 後・開・後

● 1 日 4 回 毎食後と就寝前

● 1 日 1 回 朝・夕・就寝前

● 1 日 2 回 朝・就寝前

● 1 日 回 時間毎

●

♥ 用法

● 1 日 3 回 毎食 後・開・後

● 1 日 4 回 毎食後と就寝前

● 1 日 1 回 朝・夕・就寝前

● 1 日 2 回 朝・就寝前

● 1 日 回 時間毎

●

♥ 日分

● 1 日 3 回 毎食 後・開・後

● 1 日 4 回 毎食後と就寝前

● 1 日 1 回 朝・夕・就寝前

● 1 日 2 回 朝・就寝前

● 1 日 回 時間毎

●

100

内 用 薬					
年 月 日					
様					
1 日	回 日分				
用 法	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%; text-align: center;">一 回 の 服 用 量</th> <th style="width: 80%;"></th> </tr> <tr> <td></td> <td>朝・昼・夕 食前・食後・食間 ねる 前 医師の指示通り</td> </tr> </table>	一 回 の 服 用 量			朝・昼・夕 食前・食後・食間 ねる 前 医師の指示通り
一 回 の 服 用 量					
	朝・昼・夕 食前・食後・食間 ねる 前 医師の指示通り				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%; text-align: center;">一 回 の 服 用 量</th> <th style="width: 80%;"></th> </tr> <tr> <td></td> <td>錠 剤 錠 カプセル 個 散 剤 包</td> </tr> </table>	一 回 の 服 用 量			錠 剤 錠 カプセル 個 散 剤 包
一 回 の 服 用 量					
	錠 剤 錠 カプセル 個 散 剤 包				

100

内 用 薬			
さま			
1日	回	日分	
(朝・昼・夕・ねる前)		食前・食後	
 二日量 包() 錠() 包() 錠()	 錠() 錠()	 カプセル 粒() 粒()	
備考			
年 月 日			

14 JULY 2005

のみぐすり

(お名前をおまがめ下さい)

様

用 法

1日 朝 昼 夕 1回に	☐ ☐	☐ 日分 ☐ 食前 ☐ 食後 ☐ 食間 ☐ 時隔毎 ☐ 包と錠剤 ☐ 錠ずつ	 ねる前
年 月 日 朝剤 昼剤 夜剤			

(どうぞ おだいじに)

DESIGN

G-107

年 月 日

様

外用薬

用法

1日 回 個

1回 個

塗布 吸入 点眼 点鼻

うがい トローチ 肛門そう入

(どのやでとかす)

38℃以上の時 悪心、嘔吐時

せきの激しい時

冷所に保存して下さい。

どうぞおだいじに!!

G-108

外用薬

年 月 日

様

1. 坐薬 (冷所に保存して下さい)

2. 塗布剤 (患部へ塗布して下さい)

3. トローチ (のまごまごになめて下さい)

4. うがい薬

5. 点眼薬

6. 点鼻薬

7. 吸入薬

用法

1日 回

G-109

外用薬

《のんではいけません》

年 月 日

様

1日 回 日分

点眼・点鼻・点耳

うがい・吸入・噴霧

塗布・貼付・坐薬

その他

G-110

外用薬

(お名前をお確かめ下さい)

様

用法

年 月 日 薬師

(どうぞおだいじに)

G-111

外用薬

様

用法 1日 回

●ぬりぐすり ●坐薬 ●解熱用坐薬 (38℃以上時)

●点眼薬 ●点鼻薬 ●塗布剤

●はりぐすり ●うがい薬 ●吸入薬

●噴霧薬 ●トローチ (のまごまごになめて下さい)

年 月 日

G-112

外用薬・注射薬

のんではいけません

様

1日 回 日分

ぬり薬

塗り薬

はり薬

うがい薬

吸入薬

点鼻薬

塗布時

注射薬

日 回 枚

年 月 日

お名前をお確かめ下さい おだいじに!!

G-113

肛門坐薬

のんではいけません

様

1日 回 日分

いたい時

腫くの時

便の時

吐き気のある時

ねる時

朝 夕

冷所(冷蔵庫等)に保存して下さい。

年 月 日

お名前をお確かめ下さい おだいじに!!

G-114

うがい薬

のんではいけません

様

1回 1包を約100ml (コップ 6分目) の水又はぬるま湯に溶かし、うがいをして下さい。

年 月 日

お名前をお確かめ下さい おだいじに!!

G-115

点眼薬

年 月 日

様

右 用法

左 眼 1日 時々

両 回 点眼

時間ごと

かゆい時

コンタクトレンズ除去後

冷所所保管

ぬるま 薬時

特記事項

G-116

めぐすり

(のまぬいでください)

年 月 日

さま

用法

(お名前をお確かめ下さい)

1日 回

両眼に

右眼に 1～2滴

左眼に

●医師の指示通りに

●外用薬保存

●よく振って使用して下さい。

(お薬手帳を〇で記入して下さい)

G-117

めぐすり

お名前をお確かめ下さい おだいじに!!

右眼 回 時間ごと

1日 左眼 回 時間ごと

両眼 回 時間ごと

1回に 種類

保管は

1.室温保存可 (日光や高温をさけて)

2.冷所保存 (凍結しないように)

年 月 日

T-101

頓服薬袋デザイン

頓服薬

年 月 日

様

用法

回 分

熱のある時 頭痛がある時 めまいの時

不眠の時 痛む時 動悸のある時

便秘の時 咳の出る時 吐き気のある時

腹痛時下下にて溶解のこと

水103mlと一緒に 服用

T-102

頓服薬

様

用法：次の通り服用して下さい。

1回 個包 回分

ねる前（不眠時）	腫痛時
ねる前（便秘時）	せきこみ時
胸痛時	下痛時
発作時	むかつき時
発熱時	頭痛時
痔痛時	

年 月 日

T-103

とんぶく

お名前をお確かめ下さい。

様

1日 回 回分

年 月 日

T-104

年 月 日

様

頓服

用法

1回 錠 包 回分

発熱時・痛む時・就寝前
発作時・眠れない時・便秘
乗車30分前・舌下に溶解

どうぞおだいじに //

T-105

頓服薬

年 月 日

様

用法

1回 包 錠ずつ

痛む時・ねる前
熱のある時

服用 回分

T-106

頓服薬

年 月 日

様

服用法

一日 回 回分

高熱時 痛む時 就寝前
その他
一回 錠 不眠時服用
一回 包・錠 便通剤

T-107

とんぶく

(お名前をお確かめ下さい)

様

用法

1回 包 錠

回分

(1日 回まで)

年 月 日 錠時

(どうぞおだいじに)

T-108

頓服薬

様

用法 1回 個包 回分

●いたむとき ●苦しいとき
(舌下にて服用)
●ねる前 ●下痢のとき
●熱の高いとき ●医師の指示どおり

年 月 日

C-107

小児科薬袋デザイン

のむくすり

ちゃん

1日 回 錠カプセル 日分

〇印の指示に従ってお飲み下さい。

食前30分
食後30分
調乳時
ねる前
医師の指示どおり

年 月 日

C-108

とんぶく

ちゃん

1回 錠 包 回分

〇印の指示に従ってお飲み下さい。

ねつのあるとき
いたいとき
せきのひどいとき

※少なくとも6時間以上はあけておのみ下さい。

年 月 日

C-109

外用薬

ちゃん

1日 回 日分

〇印の指示に従ってお使い下さい。

うがい
点眼
点鼻
患部にぬる
肛門にぞう入

※たべられません。
冷蔵庫に保存して下さい。

年 月 日

C-110

のむくすり

用法

1日 回 日分

食前・食後・食間

時間毎・朝・昼・夕・ねる前

毎回 包・錠をおのみ下さい。

ちゃん

C-111

のむくすり

ちゃん

◇用量

1回 錠 包 錠ずつ

◇用法

食前・食後・食間
ねる前・医師の指示通り
時間ごとに

年 月 日

